

关于新型流感（甲流）的基本信息

1. 新型流感（甲流）指的是

人类感染了源自于猪的流感病毒 A/H1N1 引发的疾病。潜伏期大约 3 至 4 天（也有可能 1 至 7 天），与季节性流感一样，有发烧、头痛、咳嗽、咽喉痛、流鼻涕、肌肉酸痛等症状。另外，有时消化器官也会出现呕吐或腹泻等症状。

很多患者只是轻微症状就康复了，但是，也有病情恶化的病例或死亡的报告。一般情况是，患有哮喘等慢性呼吸器官疾病、心脏病、糖尿病的人，免疫能力不健全的人，孕妇等更容易病情恶化。

另外，源自于猪的流感病毒 A/H1N1 与季节性在人类中流行的流感病毒——A/H1N1（A 苏联型）的基因排列是不同的。

2. 原因与感染途径

原因是源自于猪的流感病毒 A/H1N1。

甲型流感人与人的传播途径与季节性流感一样，主要有“飞沫感染”，即吸入患者咳嗽或喷嚏里的病毒、以及“接触感染”，即用沾有病毒的手接触口鼻等。

3. 治疗

治疗方法与季节性流感一样，以抗流感药物——奥司他韦（Oseltamivir）（药名：达非）、扎那米韦（Zanamivir）（药名：乐瑞沙）等为主，对呼吸器官症状或全身症状进行治疗。

4. 预防要点

预防新型流感（甲流）有两个要点，一是“厉行洗手、漱口”，二是“咳嗽礼节”。

● 厉行洗手、漱口

外出归来，要养成洗手和漱口的习惯哟！

关于正确的洗手方法，请参照[\(另页\)](#)。

洗手与漱口是个人卫生的基础。外出归来，要养成洗手和漱口的习惯。另外，咳嗽或打喷嚏时用手捂嘴之后也需要洗手。

在不能用流水洗手时，使用擦拭式酒精洗手液也有效。但是，如果手上有可以看到的明显污垢，消毒效果会变低，这种情况下请用流水、肥皂洗手。

●咳嗽礼节

咳嗽或打喷嚏时，请用面巾纸或口罩捂住嘴与鼻子，避免飞沫直接波及到别人。

1. 有咳嗽、打喷嚏的症状时戴上口罩。
2. 咳嗽、打喷嚏时用面巾纸捂住嘴和鼻子。
3. 咳嗽、打喷嚏时要将脸避开周围的人。

5. 就诊·咨询

关于新型流感（甲流），可以在静冈市内的一般医疗机关接受诊断。为了防止感染扩大，请事先跟医疗机关进行电话联系，接受有关来院时间或方法等指示。就诊时为了遵守咳嗽礼节，请戴上口罩。

诊断后，基本上是在家里进行疗养。但是考虑到原有基础病症或病状等，也有时要进行住院治疗。

●有关孕妇、原有基础病症的人的就诊等

关于孕妇是不是特别容易感染新型流感（甲流）、会不会影响到胎儿，现在还不太清楚。已知孕妇感染了季节性流感时，很多人会出现典型的流感症状并引起肺炎等并发症或早产。

孕妇在采取洗手等一般性预防对策的同时，要注意身体状况的变化，如果突然出现突发性发烧、咳嗽、喉咙痛疼等症状的话，要跟经常就诊的产科医生联系，请医生介绍合适的医疗机关。产科医生有时需要向就诊的医疗机关提供您的诊疗信息。

正在进行慢性呼吸器官疾病、心脏病、糖尿病治疗的人、正在透析中的人、免疫功能低下的人，这些有基础病症的各位，事先要与经常就诊的医生进行电话联系，确认受诊方法等以后再去就诊。

没有经常就诊的医生、不知道要就诊的医疗机关时、或有关在家疗养时的问题等，请向
新型流感咨询中心咨询 电话：054-249-3173 限日本語 平日：上午 8：30-下午 5：30。

6. 致患者与其家人

新型流感（甲流）与季节性流感不同，几乎所有的人都没有免疫力。因此，尽量防止感染扩大的行动很重要。

为了避免新型流感（甲流）流行的扩大化，至少退烧后两天之内、或从有喉咙痛疼等症状开始的第二天算起，7天之内，请尽量避免在人多的地方活动。

●对患者的要求

1. 认真按时服药
2. 在主治医生或保健所指定的期间内，除就诊以外尽量减少外出。
3. 就诊或接受护理时，为遵守咳嗽礼节戴上口罩
4. 尽量多洗手

●对患者家人的要求

患者有如下症状时，请与医疗机关电话联系后尽早去就诊。如果叫救护车，请告之有流感的症状。

- 呼吸困难
- 嘴唇发紫
- 患者诉说胸部疼痛
- 有脱水的可能性
因不断呕吐而摄取的水分不足、尿量很少、婴儿哭泣时没有眼泪
- 有痉挛现象
- 情绪混乱或很兴奋的样子
- 对别人打招呼反应迟钝

●护理要点

1. 洗手要干净
2. 对患者进行护理时戴上口罩
3. 将患者使用过的面巾纸、口罩等放在塑料袋里扔掉
4. 给患者提供专用房间
(如有困难,其他人休息时要远离患者1米以上)
5. 限定对患者进行护理的人
(有心脏病、糖尿病等基础疾病的人,孕妇,因患有其它疾病而免疫力降低的人,尽量不要进行护理)
6. 经常打开患者房间的窗户进行通风
(通风时,将房间的门关上)
7. 洗手后使用一次性纸毛巾或个人专用的毛巾
8. 家庭内保持清洁(参照如下)

●关于家庭内的打扫、消毒

有关患者使用的房间或物品的处理,请参考如下内容。

患者使用的房间或物品的处理

地方・物品	处理方法
房间地板	用湿的拖把或抹布擦拭
把手、马桶座 开关、扶手 桌子、椅子等	用消毒液(下记)擦拭
餐具・衣服・床单・浴缸等	进行一般的洗餐具、洗衣服、打扫浴室

消毒种类与方法

房间或衣服等粘上患者的血液、排泄物、体液（汗水除外）时，用如下方法方法中任何一种进行消毒。不提倡喷洒药剂，因为会使病毒飞扬、消毒不充分，自己也有可能吸进病毒。

进行打扫、消毒时，要戴上手套、口罩和能够保护眼睛的眼镜等。

乙醇消毒液	用在药店等地方可以买到的“乙醇消毒液”浸湿一次性纸毛巾等，再去擦拭需清洁的地方
次氯酸钠	将次氯酸钠漂白剂稀释液浸湿一次性纸毛巾等，再去擦拭需清洁的地方（参照如下的稀释方法）
热水消毒	使用 80 度的热水将衣服或餐具消毒 10 分钟以上

资料：厚生劳动省《新型流感积极性疫学调查实施纲要》

《参考：次氯酸钠漂白剂等的稀释方法》

（市面上销售的漂白剂：氯浓度约为 5%时）

0.02%……用于衣服的消毒或擦拭物品

0.1% ……用于处理呕吐物、粪便、体液（血液等）

（备注）次亚氯化钠会腐蚀金属，因此在用于金属部分时，10 分钟左右后就要用湿布擦拭。

并且，有可能产生氯气瓦斯，所以，请使用时一定要通风。

浓度（稀释倍率）	稀释方法
0.02%（200ppm）	一个 2 公升塑料瓶的水里放 10 毫升 （2 个塑料瓶盖儿的量）
0.1%（1000ppm）	一个 500ml 塑料瓶的水里放 10 毫升 （2 个塑料瓶盖儿的量）


让我们洗手吧！

把肥皂搓出泡沫，按如下顺序洗手吧！

洗手前的准备

- ◆指甲剪了吗？
- ◆手表和戒指摘了吗？

Check!



污垢容易残留的地方

- ◆指尖
- ◆手指缝儿
- ◆拇指周围
- ◆手腕
- ◆手上的皱纹

1) 把肥皂搓出泡沫，仔细搓手心



(2) 手背平伸，仔细搓洗



(3) 仔细搓指尖·指甲缝儿



(4) 洗手指缝儿



(5) 用手握住拇指相互搓洗



(6) 不要忘记洗手腕



把肥皂冲洗干净，用干净的毛巾擦干